

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

5, Place Paul Jamot - 51-REIMS - Tél. 47.22.87

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

BULLETIN N° 93 de JUIN 1968

10 juin 1968

VIGNE

AVERTISSEMENTS

Mildiou - En raison de l'évolution de la végétation et de la présence de taches en différents points du vignoble, un traitement doit être appliqué dès réception de l'avis dans toutes les vignes de Champagne.

Vers de la grappe - Ajouter à la bouillie précitée un produit curatif tel que le parathion.

INFORMATION

Oïdium - Ajouter à la bouillie un soufre mouillable ou un produit à base de Dinocap.

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

Tavelure du pommier et du poirier - Un examen minutieux des arbres du verger est recommandé afin d'en bien connaître l'état sanitaire, des contaminations secondaires pouvant maintenant se réaliser à partir du feuillage déjà infesté. De nouvelles sorties de taches foliaires ayant eu lieu entre le 5 et le 10 juin, il faut assurer une protection de la végétation et de la jeune récolte avant les prochaines pluies.

Carpocapse des pommes - Les premiers papillons sont apparus, mais aucune intervention n'est pour l'instant nécessaire, les conditions climatiques étant peu favorables aux pontes.

INFORMATIONS

Monilia des cerisiers - Poursuivre l'élimination par la taille des rameaux atteints par le champignon.

Mouche des cerises - Des éclosions importantes ont été observées dans la première semaine de juin ; sur les seules variétés généralement attaquées par cette mouche effectuer un traitement à l'aide d'un des insecticides suivants :

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| D.D.T. 125 g. H.A./Hl | délai d'utilisation avant récolte | 15 jours |
| Diazinon 30 g. H.A./Hl | " " " " | 15 " |
| Diméthoate 30 g. H.A./Hl | " " " " | 15 " |
| Fenthion 50 g. H.A./Hl | " " " " | 7 " |
| Fornothion 50 g. H.A./Hl | " " " " | 7 " |
| Oléoparathion 20 g. H.A./Hl .. | " " " " | 7 " |

Une seconde intervention est préconisée à 10-12 jours d'intervalle.

/...

Puceron vert du prunier - mirabellier ... - Effectuer très rapidement un traitement dès l'apparition des premières feuilles vrillées. Ce puceron cause tous les ans de gros dommages au feuillage des pruniers.

G R A N D E C U L T U R E

AVERTISSEMENT

Mildiou de la pomme de terre - Sur toutes les variétés sensibles à cette maladie, il est conseillé de réaliser un traitement pour le 15 juin. Pour cette même date la protection doit être renouvelée pour les cultures situées en secteurs très favorables au mildiou et qui ont fait l'objet de notre avis du 30 Mai.

INFORMATIONS

Meligèthes sur colza de printemps - Surveiller toujours les colzas n'ayant pas encore atteint le stade de la floraison même s'ils ont déjà été l'objet d'une protection contre cet insecte. Un nouveau traitement peut en effet se révéler indispensable par suite de la lente évolution de la végétation et de recontaminations.

Charançon des siliques sur colza de printemps - Il ne semble pas que ce parasite doive poser de problème pour la plupart des colzas de printemps. Toutefois surveiller les cultures dans les secteurs où la proportion des colzas de printemps est relativement faible par rapport à celle des colzas d'hiver. Intervenir en tout début de floraison lorsqu'on remarque en moyenne un insecte par pied, en mettant en oeuvre un produit non dangereux pour les abeilles si la culture présente plus de 100 fleurs au m².

Pégomyie de la betterave - En secteurs très tardifs, surveiller encore les jeunes betteraves qui évoluent lentement.

Dans les autres situations le traitement ne se justifie plus.

Dégâts de lièvres sur betteraves - Des dégâts occasionnés par les lièvres, à ne pas confondre avec ceux de l'atomaire, sont signalés dans de nombreux secteurs : plantes sectionnées à la file, et racines rongées rez-terre. Constituer des abreuvoirs en bordure des pièces (des pneus coupés en deux, au niveau de la bande de roulement, conviennent parfaitement).

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire "CHAMPAGNE"